



**Tabla 1: Crianza artificial de cachorros 2008**

	Fecha de ingreso	Edad (días)	Peso (g)
<b>Elfo</b>	20-03-08	0	194.5
<b>Eucalipto</b>	8-04-08	1	163.6
<b>Ébano</b>	11-04-08	0	173.4
<b>Espliego</b>	11-04-08	0	190
<b>Ecológico</b>	15-04-08	8	370
<b>Erizo</b>	24-04-08	13	470



La opción más acertada para el correcto desarrollo de un cachorro de linco ibérico es que pueda criarse al abrigo de su madre, siendo la crianza artificial una opción a tener en cuenta sólo cuando todos los factores y circunstancias señalen un alto riesgo de pérdida y/o afección del cachorro, de la madre o de los hermanos de camada.



Esta temporada de cría un total de seis cachorros están siendo criados a mano en el Centro de Cría El Acebuche (ver tabla 1 y boletín 48); todos ellos son hijos de hembras primerizas (*Brisa* y *Boj*) o sin experiencia maternal previa (*Aliaga*).



Para criar a mano con éxito a un cachorro recién nacido es preciso contar con instalaciones y materiales específicos para la crianza. Siendo los siguientes aspectos los más importantes a tener en cuenta:



-Mantener la **temperatura**: Los neonatos no son capaces de autorregular su temperatura corporal por lo que se necesita un alojamiento -tipo incubadora- que permita la regulación de la temperatura ambiente. Tanto el interior de la incubadora como la habitación donde ésta se encuentra deben mantener una temperatura similar. Ésta irá variando en función de la edad del cachorro como se indica en la tabla 2.

-Mantener la **nutrición e hidratación**: Durante el primer mes de vida se alimenta al cachorro con una leche de reemplazo comercial de las que existen varias marcas adecuadas en el mercado: Esbilac, Lactadiet, KMR y Royal Canin. En función de la edad de los cachorros, el número de veces que deben ser alimentados al día -nº de tomas- varía (ver tabla 3); Este año en El Acebuche se han llegado a proporcionar hasta un total de 36 biberones diarios durante varias semanas.

**Tabla 2**

Edad del cachorro	Temperatura del alojamiento
Primeras 24 horas	30-32°C
Primera semana	28-30°C
Segunda y tercera semana	26-27°C
A partir 4ª semana	24-25°C

-Mantener la **higiene**: Los neonatos tienen un sistema inmunitario poco desarrollado, especialmente si no han podido ingerir calostro materno. Las medidas higiénicas deben extremarse al manejar cachorros recién nacidos para evitar transmitirles agentes infecciosos durante su alimentación y manejo.

**Tabla 3**

	Nº de tomas al día	Intervalo entre tomas	Descanso
1ª semana	7-8	3 horas	3-0 horas
2ª y 3ª semana	5-6	3,5 horas	6-5 horas
4ª semana	4	4 horas	8 horas
5ª semana hasta el destete	4	4 horas	8 horas
Destete hasta los 6 meses	3	5 horas	8 horas

Aunque todos los cachorros han superado ya el segundo mes de vida y se encuentran fuertes, *Elfo* -prematuro de *Brisa*- mantiene al personal del centro preocupado desde que cumplió los 75 días de edad.

Durante la mañana del 3 de junio comenzó a manifestar ataques convulsivos que se han seguido repitiendo con regularidad. La batería de pruebas realizadas hasta la fecha no denotan ninguna anomalía. El cachorro responde bien al tratamiento y se han programado pruebas adicionales (resonancia magnética) para ayudar a diagnosticar el problema subyacente.




Figura 2. Evolución del color del iris de cachorros de Linco

